




GMINA POLICZNA


Prognoza oddziaływania na środowisko planu ogólnego Gminy Policzna

Załącznik graficzny nr 2



Wyniesienie - Florianów

skala mapy 1:10000



0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 km

Skala mapy 1:25 000

Legenda

granicze działek ewidencyjnych

obszary o określonym prawdopodobieństwie powodzi

szczególnego zagrożenia powodzią z prawdopodobieństwem 10%

szczególnego zagrożenia powodzią z prawdopodobieństwem 1%

z prawdopodobieństwem 0,2%

grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I-III oraz grunty leśne

użytki rolne klas chronionych

las

zasięg korytarza ekologicznego

Dolina Pilicy Pn

złóża i kopaliny

tereny górnicze

obszary górnicze

udokumentowane złoża kopaliny

główne zbiorniki wód podziemnych

Dolina środkowej Wisły (Warszawa - Puławy) GZWP nr 222

Niecka radomska GZWP nr 405

formy ochrony przyrody

rezerwat Okólny Ług

otulina rezerwatu Ogólny Ług

Natura 2000 - OSO Ostoja Kozienicka

Natura 2000 - SOO Puszcza Kozienicka

Kozienicki Park Krajobrazowy (przyległa do granicy gminy)

otulina Kozienickiego Parku Krajobrazowego

pomniki przyrody

drzewo

grupa drzew

drogi publiczne

krajowa (droga główna ruchu przyspieszonego)

krajowa (droga główna)

powiatowa (droga zbiorcza)

gminna (droga lokalna)

pozostałe uwarunkowania

strefy ochronne ujęć wody

tereny zmeliorowane

system przyrodniczy

las

las wodochronne

strefa ochronna linii elektroenergetycznej najwyższych napięć

strefa ochronna linii elektroenergetycznej wysokich napięć

LEGENDA	
USTALENIA PLANU	
Granice	granicę obszaru objętego planem ogólnym gminy
Przeznaczenie terenów	
1	tereny wiejskie (z zabudową mieszkaniową wielorodzinną)
2	tereny wiejskie (z zabudową mieszkaniową jednorodzinną)
3	tereny zagrodowe

1	strefa usługowa	- zwiększenie powierzchni biologicznej czynnej (średnio do 35,5%) - degradacja pokryw glebowych - zmian ukształtowania powierzchni i właściwości gruntów (wyworywanie, ugniatanie, zagęszczanie) - ograniczenie infiltracji powierzchniowej i retencji gruntowej oraz przyspieszenie spływu powierzchniowego - możliwość obniżenia pierwszego poziomu wód gruntowych - pogorszenie klimatu akustycznego oraz zanieczyszczenia powietrza - ograniczenie miejsc bytowania fauny i flory, w tym zbiorowisk leśnych - przekształcenia w kierunku krajobrazu małych miast
2	strefa gospodarcza	- zwiększenie powierzchni biologicznej czynnej (średnio do 35,5%) - degradacja pokryw glebowych - zmian ukształtowania powierzchni i właściwości gruntów (wyworywanie, ugniatanie, zagęszczanie) - ograniczenie infiltracji powierzchniowej i retencji gruntowej oraz przyspieszenie spływu powierzchniowego - możliwość obniżenia pierwszego poziomu wód gruntowych - pogorszenie klimatu akustycznego oraz zanieczyszczenia powietrza, w tym pochodzenia przemysłowego - ograniczenie miejsc bytowania fauny i flory, w tym zbiorowisk leśnych - przekształcenia w kierunku krajobrazu wiejskiego
3	strefa produkcji rolnej	- zwiększenie powierzchni biologicznej czynnej (średnio do 35,5%) - degradacja pokryw glebowych - zmian ukształtowania powierzchni i właściwości gruntów (wyworywanie, ugniatanie, zagęszczanie) - ograniczenie infiltracji powierzchniowej i retencji gruntowej oraz przyspieszenie spływu powierzchniowego - możliwość obniżenia pierwszego poziomu wód gruntowych - pogorszenie klimatu akustycznego oraz zanieczyszczenia powietrza, w tym pochodzącego z produkcji rolnej - ograniczenie miejsc bytowania fauny i flory, w tym zbiorowisk leśnych - przekształcenia w kierunku krajobrazu wiejskiego
4	strefa infrastrukturalna	- zwiększenie powierzchni biologicznej czynnej (średnio do 35,5%) - degradacja pokryw glebowych - zmian ukształtowania powierzchni i właściwości gruntów (wyworywanie, ugniatanie, zagęszczanie) - ograniczenie infiltracji powierzchniowej i retencji gruntowej oraz przyspieszenie spływu powierzchniowego - możliwość obniżenia pierwszego poziomu wód gruntowych - pogorszenie klimatu akustycznego oraz zanieczyszczenia powietrza - ograniczenie miejsc bytowania fauny i flory, w tym zbiorowisk leśnych
5	strefa zieleni i rekreacji	- zwiększenie powierzchni biologicznej czynnej (średnio do 35,5%) - zachowanie zasobów rezerwacji gruntów - zachowanie funkcji stabilizujących warunki klimatyczne i aerodynamiczne w mieście - zachowanie elementów systemu przyrodniczego miasta - kształtowanie przez człowieka warunków siedliskowych (wprowadzanie konkretnych gatunków roślin, nasadzenia, osłanianie budynków mieszkalnych itp.) - zróżnicowanie w środowisku związanego z realizacją funkcji wypoczynku i rekreacji
6	strefa orientacyjna	- zwiększenie powierzchni biologicznej czynnej (średnio do 35,5%) - degradacja pokryw glebowych - zróżnicowanie zasobów rezerwacji gruntów (wyworywanie, ugniatanie, zagęszczanie) - ograniczenie infiltracji powierzchniowej i retencji gruntowej oraz przyspieszenie spływu powierzchniowego - możliwość obniżenia pierwszego poziomu wód gruntowych - pogorszenie klimatu akustycznego oraz zanieczyszczenia powietrza - ograniczenie miejsc bytowania fauny i flory, w tym zbiorowisk leśnych
7	strefa górnicza	- zwiększenie powierzchni biologicznej czynnej (średnio do 35,5%) - powstawanie wielkopowierzchniowych przekształceń terenu w postaci wyrobisk poeksploatacyjnych - degradacja pokryw glebowych - obniżenie poziomu wód gruntowych - większenie zanieczyszczenia, w tym zapylenia atmosfery - zróżnicowanie w tym związane z procesem górnictwa i obrotu komunikacyjnego - do zakończenia działalności wydobywczej należy rekultywacja terenu, w kierunku zgodnym z wytycznymi zawartymi w koncepcji (np. lasy, wodny, rekreacyjny)
8	strefa owarowa	- zwiększenie powierzchni biologicznej czynnej (średnio do 35,5%) - zachowanie zasobów rezerwacji gruntów - zachowanie funkcji stabilizujących warunki klimatyczne i aerodynamiczne w mieście - zachowanie elementów systemu przyrodniczego miasta - kształtowanie przez człowieka warunków siedliskowych (wprowadzanie konkretnych gatunków roślin, nasadzenia, osłanianie budynków mieszkalnych itp.) - zróżnicowanie w środowisku związanego z realizacją funkcji wypoczynku i rekreacji
9	strefa komunikacyjna	- zwiększenie powierzchni biologicznej czynnej (średnio do 35,5%) - degradacja pokryw glebowych - zmian ukształtowania powierzchni i właściwości gruntów (wyworywanie, ugniatanie, zagęszczanie) - ograniczenie infiltracji powierzchniowej i retencji gruntowej oraz przyspieszenie spływu powierzchniowego - możliwość obniżenia pierwszego poziomu wód gruntowych